

## **CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 10 POSTI DI INFERMIERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI**

### **CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA:**

La Commissione predispone, seduta stante, per la prova scritta tre batterie di prove contenenti ciascuno 15 domande, ai sensi dell'art. 12 comma 1) del D.P.R. nr. 220/01 e così denominate:

*Prova scritta n. 1: "Vedi allegato"*

*Prova scritta n. 2: "Vedi allegato" (prova estratta)*

*Prova scritta n. 3: "Vedi allegato"*

- La prova consiste nella soluzione di n. 15 quesiti a risposta multipla, con 4 alternative di risposta di cui solo una esatta;
- Ad ogni risposta errata, omessa o multipla non verrà attribuito alcun punteggio;
- La sufficienza si ottiene conseguendo il punteggio minimo di 21/30, ossia rispondendo correttamente a 9 quesiti su 15;

Si riporta di seguito la griglia di attribuzione dei punteggi:

<i>risposta</i>	<i>punti</i>
1	2,33
2	4,67
3	7,00
4	9,33
5	11,67
6	14,00
7	16,33
8	18,67
9	21,00
10	22,50
11	24,00
12	25,50
13	27,00
14	28,50
15	30,00

### **CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA:**

Per la prova pratica la Commissione predispone tre batterie di prove contenenti 10 domande ciascuna, ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.R. e così denominate:

*Prova Pratica n. 1: "Vedi allegato"*

*Prova Pratica n. 2: "Vedi allegato"*

*Prova Pratica n. 3: "Vedi allegato" (prova estratta)*

- La prova consiste nella soluzione di n. 10 quesiti ciascuno a risposta multipla con 4 alternative di risposta;
- Ad ogni risposta errata o omessa non verrà attribuito alcun punteggio;
- La sufficienza si ottiene conseguendo il punteggio minimo di 14/20, ossia rispondendo correttamente a 6 quesiti su 10;

Si riporta di seguito la griglia di attribuzione dei punteggi:

risposta	punti
1	2,33
2	4,67
3	7,00
4	9,33
5	11,67
6	14,00
7	15,50
8	17,00
9	18,50
10	20,00

Serie 11/09/2024

Il Presidente  
*Milena dr.ssa Mauri*

PROVA  
NON  
ESTIMATA

*Paolo Cusi*

11/09/14



**PROVA SCRITTA N. 1**

Quesito n. 1	Risposta
<b>La scala Barthel valuta:</b>	
Il grado di dipendenza del caregiver	A
Nessuna delle risposte è corretta	B
Il grado di autonomia nell'esecuzione delle ADL	C
Il grado di dipendenza del personale medico e sanitario	D

Quesito n. 2	Risposta
<b>Cosa produce una misura falsamente elevata nella rilevazione della pressione arteriosa?</b>	
L'uso di un bracciale troppo piccolo	A
La rilevazione nell'arto superiore sinistro	B
L'uso di un bracciale elettronico	C
La rilevazione nell'arto superiore destro	D

Quesito n. 3	Risposta
<b>Quale dei seguenti segni non è una manifestazione clinica dell'ipovolemia?</b>	
Secchezza delle mucose	A
Oligoanuria	B
Turgore delle giugulari	C
Ipotensione	D

Quesito n. 4	Risposta
<b>Quale malattia si cura con l'insulina?</b>	
L'asma	A
L'orticaria	B
L'ipertiroidismo	C
Il diabete mellito	D

Quesito n. 5	Risposta
<b>Durante l'accertamento della funzione intestinale, quale tra questi metodi non viene utilizzato?</b>	
Esame obiettivo	A
Intervista	B
Rx bacino	C
Osservazione diretta	D



Quesito n. 6	Risposta
<b>Quale dei seguenti farmaci è utilizzato per favorire il sonno, ma può causare dipendenza?</b>	
Paracetamolo	A
Bromazepam	B
Amoxicillina	C
Ibuprofene	D

Quesito n. 7	Risposta
<b>Quale dei seguenti è un segno di emorragia alta nel tratto gastrointestinale?</b>	
Ematochezia	A
Tenesmo rettale	B
Melena	C
Diarrea	D

Quesito n. 8	Risposta
<b>Un BMI (Body Mass Index) compreso tra 30 e 34,9 è indice di:</b>	
Sovrappeso	A
Normopeso	B
Nessuna delle precedenti	C
Obesità di I classe	D

Quesito n. 9	Risposta
<b>Per bradicardia si intende:</b>	
Una frequenza cardiaca superiore a 75 bpm	A
Una frequenza cardiaca inferiore a 50 bpm	B
Un abbassamento del ritmo cardiaco sintomatico per capogiri e sincope	C
Una riduzione della frequenza cardiaca del 20% rispetto alla frequenza cardiaca usuale	D

Quesito n. 10	Risposta
<b>L'inflammatione acuta è caratterizzata da:</b>	
Rubor, tumor, calor, dolor, functio lesa	A
Rumor, tumor, calor,	B
Rumor, tumor, fibrosi	C
Rumor, tumor, fagocitosi	D



Quesito n. 11	Risposta
<b>La comparsa di petecchie e porpora può essere causata da bassi valori di:</b>	
Leucociti	A
Mastociti	B
Piastrine	C
Eritrociti	D

Quesito n. 12	Risposta
<b>Per valutare gli scambi gassosi di un paziente è necessario:</b>	
Nessuna delle precedenti	A
Un prelievo capillare	B
Un prelievo arterioso	C
E' indifferente, qualsiasi campione ematico è utile	D

Quesito n. 13	Risposta
<b>La sindrome epatorenale è.</b>	
Insufficienza renale acuta associata a cirrosi epatica avanzata	A
Insufficienza renale cronica	B
Nessuna delle alternative	C
Insufficienza renale acuta	D

Quesito n. 14	Risposta
<b>La Repubblica Italiana tutela il diritto degli individui alla salute, secondo:</b>	
La legge 833 del 1978	A
L'articolo n. 32 della Costituzione	B
Il Giuramento di Ippocrate	C
Il Codice Deontologico dell'Infermiere	D

Quesito n. 15	Risposta
<b>I LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) sono definiti:</b>	
Dalla Costituzione Italiana	A
Dal Ministero della Salute	B
Dal Piano Sanitario Regionale	C
Dal profilo professionale dell'Infermiere	D

PROVA  
ESINATA

Paolo Cuff

11/10/12



PROVA SCRITTA N. 2

Quesito n. 1	Risposta
<b>Qual è la funzione principale dell'intestino crasso?</b>	
Digestione dei nutrienti	A
Produzione di enzimi digestivi	B
Trasporto del chimo	C
Assorbimento dell'acqua e degli elettroliti	D

Quesito n. 2	Risposta
<b>L'insufficienza renale acuta si manifesta solitamente con l'aumento di:</b>	
Magnesio	A
Gonadotropina	B
Calcemia	C
Creatininemia	D

Quesito n. 3	Risposta
<b>Le maggiori complicanze della disfagia sono:</b>	
Polmonite ab ingestis	A
Disidratazione	B
Malnutrizione	C
Tutte le precedenti	D

Quesito n. 4	Risposta
<b>La nutrizione enterale è somministrata tramite:</b>	
Accessi venosi periferici o centrali	A
SNG o PEG	B
SNG o accessi venosi centrali	C
solo ed esclusivamente PEG	D

Quesito n. 5	Risposta
<b>Le dimensioni del bracciale dello sfigmomanometro devono essere commisurate</b>	
All'età del paziente	A
Alla statura del paziente	B
Alla costituzione fisica del paziente indipendentemente dal sesso	C
Al sesso del paziente	D



Quesito n. 6	Risposta
<b>Gli enzimi di funzionalità epatica sono:</b>	
AST/ALT	A
Nessuna delle risposte è corretta	B
Urea e creatinina	C
Troponina e CPK-MB	D

Quesito n. 7	Risposta
<b>Quale di questi è un marcatore di infarto miocardico acuto?</b>	
Tireotropina	A
Cisteina	B
PCR	C
Troponina	D

Quesito n. 8	Risposta
<b>La comparsa di ulcera duodenale è spesso associata alla presenza di:</b>	
Citomegalovirus	A
Salmonella	B
Escherichia coli	C
Helicobacter pylori	D

Quesito n. 9	Risposta
<b>La terapia del dolore è:</b>	
Un approccio razionale che prevede 3 scale in cui si inizia con i FANS e si procede con farmaci oppioidi con azione analgesica progressiva	A
Un approccio razionale che prevede 3 scale in cui si inizia con farmaci a base di morfina a selettività crescente	B
Un approccio razionale che prevede 4 scale in cui si inizia con farmaci a basse di morfina a selettività crescente	C
Nessuna delle precedenti	D

Quesito n. 10	Risposta
<b>Quale è il principale veicolo di infezione ospedaliera?</b>	
Il paziente	A
La strumentazione medica	B
Le mani dell'operatore	C
La documentazione clinica	D



Quesito n. 11	Risposta
<b>La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" è stata sostituita dalla denominazione "professione sanitaria" grazie all'applicazione di quale normativa?</b>	
Legge 42 del 26/02/99	A
D.M. 270/2004	B
D.M. 01/01/00 n. 509	C
D.M. 739/1994	D

Quesito n. 12	Risposta
<b>Nella ricerca clinica che cosa indica la sigla "RCT"?</b>	
Random Controlled Treatment	A
Randomized Controlled Trial	B
Research Controlled Trial	C
Random Controlled Trial	D

Quesito n. 13	Risposta
<b>Gli effetti collaterali principali dei farmaci antistaminici di prima generazione sono:</b>	
Oliguria	A
Sonnolenza legata al blocco dei recettori della istamina a livello dell'encefalo	B
Nausea e vomito legati all'attivazione dei centri del vomito dell'encefalo	C
Iperattività legata all'attivazione dei recettori della istamina dell'encefalo	D

Quesito n. 14	Risposta
<b>La posizione di Fowler viene assunta dal paziente quando:</b>	
È seduto	A
E' sdraiato	B
E' supino	C
E' sdraiato sul fianco destro	D

Quesito n. 15	Risposta
<b>Che cosa si intende per anuria?</b>	
Diuresi minore di 100 ml/die	A
Diuresi minore di 400 ml/die	B
Presenza di globo vescicale	C
Diuresi maggiore di 400 ml/die	D

PROVA  
NON  
ESTATA

Paolo Anf

11/09/2014



PROVA SCRITTA N. 3

Quesito n. 1	Risposta
<b>Quale, tra questi i seguenti fattori di rischio, può favorire lo sviluppo di una neoplasia?</b>	
L'esposizione al fumo	A
L'obesità	B
L'abuso di alcool	C
Tutte le alternative sono corrette	D

Quesito n. 2	Risposta
<b>Per la rilevazione della pressione arteriosa, come deve essere posizionato il paziente?</b>	
Seduto con il braccio all'altezza del cuore	A
In piedi	B
Coricato con le gambe più basse del tronco	C
Come preferisce il paziente	D

Quesito n. 3	Risposta
<b>Tra le 7 G vi è compreso il giusto paziente: quale delle seguenti affermazioni è corretta per l'identificazione del paziente?</b>	
Non è necessaria la verifica dell'identità della persona	A
Solo l'uso identificativo di nome e cognome	B
Utilizzo di due elementi identificativi: nome e cognome, data di nascita	C
Il numero identificativo attribuito in pronto soccorso	D

Quesito n. 4	Risposta
<b>Quali sono i segni e sintomi tipici di un paziente con IMA?</b>	
Dolore toracico e pallore	A
Dolore toracico e spasmi	B
Dolore toracico, sudorazione algida e pallore	C
Dolore toracico, sudorazione algida e febbre	D

Quesito n. 5	Risposta
<b>Che cosa si intende per stranguria?</b>	
Minzione esitazionale	A
Minzione difficoltosa	B
Minzione frequente	C
Minzione dolorosa e intermittente	D



Quesito n. 6	Risposta
<b>Nel cateterismo vescicale, sono definiti "sistemi a circuito chiuso"</b>	
Dispositivi di raccolta delle urine da catetere vescicale provvisti di valvola di sicurezza che evitano la sostituzione dei contenitori di raccolta a cielo aperto	A
Tecniche di posizionamento che prevedono il lavaggio vescicale continuo	B
Cateteri vescicali rigidi o semirigidi	C
Nessuna delle alternative è corretta	D

Quesito n. 7	Risposta
<b>Per l'esecuzione di una coltura ematica, il campione di sangue deve essere prelevato:</b>	
Quando la temperatura corporea supera i 39°	A
Circa un'ora dopo la puntata febbrile	B
Durante l'aumento di temperatura corporea	C
Ripetutamente dopo la puntata febbrile	D

Quesito n. 8	Risposta
<b>Qual è il ruolo dell'OSS in caso di terapia orale?</b>	
Su indicazione del personale preposto, può preparare i farmaci prescritti all'assistito	A
In presenza del personale preposto può svolgere qualsiasi tipo di attività	B
Su indicazione del personale preposto è in grado di aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti	C
Non può in nessun caso avvicinarsi all'assistito nella fase di somministrazione della terapia	D

Quesito n. 9	Risposta
<b>Il polmone interviene nell'equilibrio acido-base:</b>	
E' un meccanismo regolatore tardivo	A
Non interviene	B
Nessuna delle alternative	C
Regolando la concentrazione di CO2 attraverso variazioni della ventilazione alveolare	D

Quesito n. 10	Risposta
<b>PubMed è:</b>	
Una rivista elettronica	A
Un'associazione professionale	B
Una banca dati elettronica di letteratura scientifica	C
Una revisione sistematica della letteratura	D



Quesito n. 11	Risposta
<b>Qual è il range di frequenza respiratoria di un adulto sano?</b>	
5-10 AR/min	A
25-30 AR/min	B
14-20 AR/min	C
35-45 AR/min	D

Quesito n. 12	Risposta
<b>Per tachicardia parossistica si intende:</b>	
Una sensazione di battito mancante seguita da un battito più violento	A
Un aumento della frequenza cardiaca superiore a 90-100 bpm, che inizia di colpo e regredisce gradualmente con l'utilizzo di ansiolitici	B
Una sensazione di cardiopalmo legata o meno ad un effettivo aumento della frequenza cardiaca	C
Un aumento della frequenza cardiaca superiore a 90-100 bpm, che inizia e regredisce improvvisamente	D

Quesito n. 13	Risposta
<b>Il campo proprio di attività e responsabilità dell'infermiere è regolamentato dai contenuti del</b>	
L.833/78, profilo professionale, codice deontologico	A
Profilo professionale, codice deontologico, ordinamento didattico di base e formazione post- base	B
Profilo professionale, codice deontologico, D.M 509/1999	C
DM 77/2022	D

Quesito n. 14	Risposta
<b>L'Evidence Based Nursing è:</b>	
La definizione dei processi assistenziali per tipologia di prestazione	A
L'utilizzo dei risultati delle ricerche scientifiche storiche, effettuate dai Ricercatori di laboratorio	B
Processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche, utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica e le preferenze del paziente	C
Uno studio caso-controllo	D



Quesito n. 15	Risposta
<b>Che cosa si intende per edema polmonare?</b>	
Aumento del sangue vascolare del polmone per trasudazione o essudazione di liquido siero-ematico nell'interstizio, negli alveoli e nei bronchioli polmonari	A
Aumento dell'acqua extravascolare del polmone per trasudazione o essudazione di liquido siero-ematico nell'interstizio, negli alveoli e nei bronchioli polmonari	B
Riduzione dell'acqua extravascolare del polmone per trasudazione o essudazione di liquido siero-ematico nell'interstizio, negli alveoli e nei bronchioli polmonari	C
Aumento dell'acqua intravascolare del polmone per trasudazione o essudazione di liquido siero-ematico nell'interstizio, negli alveoli e nei bronchioli polmonari	D

PROVA  
NON ESTRATTA

11/SET/12



PROVA PRATICA N. 1

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Quesito n. 1	
<b>Il candidato indichi la sequenza corretta per il posizionamento di un sondino naso – gastrico</b>	
a)	Controllare che le narici siano pulite
b)	Introdurre la sonda attraverso la narice fino al retro-faringe, puntando in basso e indietro. Dopo che la sonda ha superato il naso - faringe flettere la testa del paziente.
c)	Indossare i guanti puliti
d)	Immergere la sonda in un lubrificante
e)	Fissare la sonda con cerotto
f)	Invitare il paziente a deglutire e, durante la deglutizione, spingere avanti la sonda, ruotandola di 180°
g)	Controllare la posizione della sonda prima di cominciare l'alimentazione
<b>Soluzione</b>	
1	a, c, f, d, b, g, e.
2	a,c,b,d, g, e, f.
3	a, c, f, b, d, g,e
4	c, a, d, b, f, g, e

Quesito n. 2	
<b>Il BLS D consiste nella sequenza di azioni che garantiscono un supporto vitale di base alla vittima di Arresto Cardiocircolatorio. Si individui la sequenza corretta:</b>	
<b>Soluzione</b>	
1	Verificare un'eventuale risposta della vittima e valutare lo stato di coscienza- Se la vittima non risponde aprire le vie aeree- Valutare la respirazione- Se il respiro è assente o anomalo allertare i servizi di emergenza- Iniziare le ventilazioni alternate alle CTE- Far portare un DAE- Quando arriva il DAE applicare le piastre ed accenderlo- Seguire le istruzioni vocali-visive fornite dal DAE
2	Iniziare le ventilazioni alternate alle CTE- Valutare la sicurezza della scena- Verificare un'eventuale risposta della vittima e valutare lo stato di coscienza- Se il respiro è assente o anomalo allertare i servizi di emergenza - Se la vittima non risponde aprire le vie aeree- Valutare la respirazione- Far portare un DAE Quando arriva il DAE applicare le piastre ed accenderlo- Seguire le istruzioni vocali-visive fornite dal DAE
3	Valutare la respirazione – Valutare la sicurezza della scena- Seguire le istruzioni vocali – visive del DAE Verificare un'eventuale risposta della vittima e valutare lo stato di coscienza- Iniziare le ventilazioni alternate alle CTE - Se il respiro è assente o anomalo allertare i servizi di emergenza- Far portare un DAE- Iniziare le ventilazioni alternate alle CTE- Quando arriva il DAE applicare le piastre ed accenderlo
4	Valutare la sicurezza della scena- Verificare un'eventuale risposta della vittima e valutare lo stato di coscienza- Se la vittima non risponde aprire le vie aeree- Valutare la respirazione- Se il respiro è assente o anomalo allertare i servizi di emergenza- Far portare un DAE- Iniziare le CTE alternate alle ventilazioni- Quando arriva il DAE accenderlo e applicare le piastre- Seguire le istruzioni vocali-visive fornite dal DAE

**Quesito n. 3**

**Un ago 22 Gauge rispetto a un ago 18 Gauge è:**

Soluzione	
1	più grande
2	più piccolo
3	di materiale diverso
4	delle stesse dimensioni, ma con filettatura differente

**Quesito n. 4**

**Quali farmaci sono di fondamentale importanza in un paziente con FA?**

Soluzione	
1	Anestetici locali
2	Anticoagulanti
3	FANS
4	Benzodiazepine

**Quesito n. 5**

**Le principali complicanze della biopsia epatica sono:**

Soluzione	
1	Occlusione intestinale
2	Sanguinamento e peritonite
3	Perforazione splenica
4	Ernia incisionale

**Quesito n. 6**

**Indicare quali tra i seguenti farmaci è un FANS**

Soluzione	
1	Bromazepam
2	Lidocaina
3	Warfarin
4	Ibuprofene

**Quesito n. 7**

**Tra gli effetti collaterali degli oppiacei ci sono:**

Soluzione	
1	Rilascio di istamina, effetti emetici e diminuzione mobilità intestinale
2	Effetti antiemetici
3	Tosse, blocco istamina ed effetti antiemetici
4	Aumento della mobilità intestinale, tosse

<b>Quesito n.8</b>	
<b>Una frequenza respiratoria di 8atti/minuto è definita:</b>	
<b>Soluzione</b>	
1	Ortopnea
2	Tachipnea
3	Bradipnea
4	Dispnea

<b>Quesito n.9</b>	
<b>Gli interventi infermieristici da attuare in un paziente in nutrizione enterale con SNG sono:</b>	
<b>Soluzione</b>	
1	Mantenere una posizione adeguata durante l'alimentazione (Fowler – Semi Fowler), valutare il ristagno gastrico, mantenere uno stato di idratazione adeguato, monitoraggio di eventuali complicanze e igiene orale
2	mantenere il paziente supino, valutare ristagno gastrico, mantenere uno stato di idratazione adeguato, monitoraggio di eventuali complicanze e igiene del cavo orale
3	Mantenere una posizione adeguata durante l'alimentazione (Fowler – Semi Fowler) e igiene orale
4	Mantenere il paziente supino, valutare ogni 7 giorni il ristagno gastrico, mantenere uno stato di idratazione adeguato, monitoraggio di eventuali complicanze e igiene del cavo orale

<b>Quesito n.10</b>	
<b>Quali, tra i seguenti valori di pressione arteriosa, depongono per diagnosi di ipertensione arteriosa nell'adulto?</b>	
<b>Soluzione</b>	
1	Pressione arteriosa sistolica maggiore o uguale a 140 mmHg e/o pressione arteriosa diastolica maggiore o uguale a 90 mmHg
2	Pressione arteriosa sistolica maggiore o uguale a 160 mmHg e/o pressione arteriosa diastolica maggiore o uguale a 90 mmHg
3	Pressione arteriosa sistolica uguale a 120 mmHg e/o pressione arteriosa diastolica minore di 70 mmHg
4	Pressione arteriosa sistolica compresa tra 140 e i 160 mmHg

PROVA  
NON ESTRATTA

11/SETT/24



## PROVA PRATICA 2

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Quesito n. 1	
<b>Il candidato indichi la sequenza corretta in caso di somministrazione in continuo di Nutrizione Enterale attraverso un sondino naso – gastrico</b>	
a	provvedere alla privacy del paziente
b	togliere i guanti e lavarsi le mani, documentare la procedura sulla cartella clinico infermieristica del paziente e relativo piano assistenziale
c	presentarsi al paziente e spiegare la procedura
d	verificare l'identità del paziente
e	somministrare l'alimentazione
<b>Soluzione</b>	
1	d, c, a, b, e
2	d, c, a, e, b
3	c, a, e, b, d
4	e, b, a, c, d

Quesito n.2	
<b>Paziente di 45 anni con dolore addominale acuto e febbre. All'esame fisico, si riscontra sensibilità diffusa all'addome. Quale dei seguenti esami ematici è più indicato per valutare la presenza di flogosi in questo paziente?</b>	
<b>Soluzione</b>	
1	PCR (Proteina C Reattiva)
2	Creatinina
3	Glicemia
4	Indici di coagulazione

Quesito n.3	
<b>Cosa fare in caso di reazione avversa all'emotrasfusione?</b>	
<b>Soluzione</b>	
1	Continuare la somministrazione di emocomponenti
2	Sospendere tempestivamente l'infusione e smaltire la sacca
3	Rimuovere la linea infusoriale e l'accesso venoso
4	Sospendere tempestivamente l'infusione, conservare la sacca, mantenere la via pervia con soluzione fisiologica, avvisare il medico di guardia, effettuare un attento monitoraggio delle condizioni cliniche dell'assistito, documentare quanto avvenuto sulla documentazione sanitaria



<b>Quesito n.4</b>	
<b>Per praticare la puntura lombare, il paziente deve essere:</b>	
	<b>Soluzione</b>
1	in decubito laterale con arti superiori iperestesi
2	in decubito prono
3	in decubito laterale con gambe flesse e testa piegata verso il torace
4	genuflesso con il dorso esteso

<b>Quesito n.5</b>	
<b>La colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP) è un esame:</b>	
	<b>Soluzione</b>
1	Solo diagnostico
2	Nessuna delle alternative è corretta
3	Tutte le precedenti
4	Diagnostico e terapeutico

<b>Quesito n. 6</b>	
<b>Che cosa monitora l'infermiere principalmente in un paziente con edema polmonare acuto?</b>	
	<b>Soluzione</b>
1	Frequenza e qualità respiratoria, pressione arteriosa, saturazione, temperatura, frequenza cardiaca, bilancio idrico, peso corporeo, livello di coscienza, rumori e suoni polmonari, emogasanalisi
2	Frequenza respiratoria, pressione arteriosa, temperatura, frequenza cardiaca, bilancio idrico, peso corporeo, livello di coscienza, rumori e suoni polmonari
3	Frequenza e qualità respiratoria, pressione arteriosa, saturazione, temperatura, frequenza cardiaca, bilancio idrico, peso corporeo, rumori e suoni polmonari, emogasanalisi
4	Pressione arteriosa, saturazione, temperatura, frequenza cardiaca, bilancio idrico, peso corporeo, rumori e suoni polmonari, emogasanalisi



<b>Quesito n.7</b>	
<b>Si individui la procedura corretta del posizionamento del catetere vescicale interno tipo Foley</b>	
<b>Soluzione</b>	
1	Informare il paziente della procedura e garantire la privacy- Posizionare il paziente supino con gambe divaricate- posizionare un telo assorbente in zona genitale – l’infermiere si lava le mani e indossa dei guanti monouso e procede con l’igiene intima- Dopo aver smaltito il materiale impegnato nell’igiene intima esegue l’igiene delle mani- Predisporre il materiale- Indossare i guanti sterili e allestisce un campo sterile - procedere all’antisepsi dei genitali del paziente- Lubrificare il tratto uretrale- Collegare la sacca di raccolta al catetere vescicale- posizionare il catetere vescicale - cuffiare il palloncino per mantenere correttamente in sede il catetere
2	Posizionare il paziente supino con gambe divaricate- posizionare un telo assorbente in zona genitale- Eseguire igiene delle mani- Predisporre il materiale- Indossare i guanti sterili e procedere all’antisepsi dei genitali del paziente- Lubrificare il tratto uretrale- Collegare la sacca di raccolta al catetere vescicale- posizionare il catetere vescicale
3	Posizionare il paziente supino con gambe divaricate- Lubrificare il tratto uretrale – posizionare il catetere vescicale- posizionare un telo assorbente in zona genitale- Eseguire igiene delle mani- Predisporre il materiale- Indossare i guanti sterili e procedere all’antisepsi dei genitali del paziente- Collegare la sacca di raccolta al catetere vescicale-
4	Informare il paziente della procedura e garantire la privacy- Posizionare il paziente supino con gambe divaricate- Eseguire igiene delle mani- Predisporre il materiale- Indossare i guanti e procedere all’igiene dei genitali del paziente- Lubrificare il tratto uretrale- Collegare la sacca di raccolta al catetere vescicale- posizionare il catetere vescicale

<b>Quesito n.8</b>	
<b>Per un corretto posizionamento del sondino naso-gastrico, è prioritario predisporre tra il materiale occorrente:</b>	
<b>Soluzione</b>	
1	Lo sfigmomanometro
2	Il fonendoscopio
3	Il pallone di Ambu
4	Una pinza di Klemmer

<b>Quesito n.9</b>	
<b>Cosa consiglieresti ad un paziente con edemi declivi, al domicilio?</b>	
<b>Soluzione</b>	
1	Una dieta ricca di sale e attività fisica
2	Nessuna delle alternative è corretta
3	Bendaggi compressivi fai da te
4	Posizionamento delle zone interessate antideclivi e mantenere l’allettamento prolungato

<b>Quesito n.10</b>	
<b>La posizione di Sims è la più idonea per</b>	
<b>Soluzione</b>	
1	facilitare e migliorare la respirazione
2	la somministrazione di un clistere evacuativo a piccolo volume
3	favorire l’afflusso di sangue al cervello in caso di lipotimia
4	prevenire le contratture dovute alla flessione delle anche e delle ginocchia

**PROVA PRATICA 3**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Quesito n.1	
<b>Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di "esecuzione di una venipuntura per prelievo di sangue":</b>	
a)	preparare il materiale
b)	sistemare il letto ad un'altezza idonea per il lavoro
c)	lavarsi le mani
d)	scegliere il braccio e posizionarlo in modo che risulti esteso in linea retta, utilizzando un ausilio (cuscino) se necessario
e)	indossare i guanti
f)	invitare il paziente a chiudere ed aprire il pugno
g)	applicare il laccio emostatico 7-10 cm sopra il punto d'inserzione dell'ago
Soluzione	
1	c - a - b - d - e - g - f
2	c - f - a - g - b - e - d
3	c - a - b - d - e - f - g
4	b - a - c - g - f - e

Quesito n.2	
<b>I diuretici permettono di:</b>	
Soluzione	
1	Aumentare la diuresi e quindi indurre una riduzione della pressione sanguigna
2	Migliorare le condizioni cliniche dei pazienti affetti da patologie cardio-vascolari come l'angina
3	Ridurre la diuresi e quindi indurre vasodilatazione
4	Ridurre la diuresi e quindi indurre una riduzione della pressione sanguigna

Quesito n.3	
<b>La disartria è:</b>	
Soluzione	
1	Un disturbo del linguaggio
2	Una difficoltà nella deambulazione
3	La difficoltà nella deglutizione di cibi solidi
4	La comparsa di parestesie agli arti inferiori

**Quesito n. 4**

**Quali sono gli interventi infermieristici che attueresti in un paziente con edema polmonare acuto?**

	<b>Soluzione</b>
1	Posizionamento di CV su indicazione medica per monitoraggio della diuresi
2	Somministrazione di terapia farmacologica secondo prescrizione medica, valutandone l'efficacia
3	Tutte le alternative sono corrette
4	Somministrazione di O2 terapia ed esecuzione di esami ematici, secondo prescrizione medica

**Quesito n.5**

**La complicanza di una calcolosi biliare è:**

	<b>Soluzione</b>
1	Ulcera gastrica
2	Steatosi epatica
3	Pancreatite acuta
4	Nessuna delle alternative è corretta

**Quesito n.6**

**Avendo una fiala da 200 mg di 10 ml di lidocaina, quanti ml si devono somministrare per ottenere 20 mg?**

	<b>Soluzione</b>
1	1 ml
2	5 ml
3	Secondo indicazione medica
4	2,5 ml

**Quesito n.7**

**Quale di queste azioni è necessaria durante la broncoaspirazione?**

	<b>Soluzione</b>
1	Monitorare SPO2
2	Utilizzare una manovra asettica e sterile
3	Far assumere alla persona la posizione di semi-Fowler o Fowler
4	Tutte le precedenti

**Quesito n. 8**

**Durante l'esecuzione di una biopsia epatica, l'infermiere deve:**

	<b>Soluzione</b>
1	Educare la persona ad inspirare ed espirare profondamente, quando è richiesto
2	Verificare che i consensi alla procedura siano firmati
3	Aiutare la persona ad assumere la posizione di decubito laterale destro
4	Monitorare i parametri vitali ed eventuali segni di shock emorragico

**Quesito n.9**

**Quali sono i segni e sintomi tipici di un paziente con FA?**

<b>Soluzione</b>	
1	Cardiopalmo e dispnea da sforzo
2	Pollachiuria
3	Nessuna delle alternative è corretta
4	Pollachiuria e cardiopalmo

**Quesito n.10**

**Quale è la prima azione da fare di fronte ad uno stravaso?**

<b>Soluzione</b>	
1	Rilevare i parametri vitali
2	Non interrompere la chemioterapia, segnare con una penna demografica il punto dello stravaso
3	Chiamare il medico e togliere immediatamente il catetere venoso presente
4	Interrompere immediatamente l'infusione di chemioterapico, lasciando il catetere venoso in sede